



centre hospitalier
mont de marsan



CONDUITE A TENIR EN CAS DE CRISE CONVULSIVE



Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan
Pôle mère-enfant,
pédopsychiatrie



- www.ch-mt-marsan.fr -





1 ASSURER LA SÉCURITÉ DE L'ENFANT

- ▶ Dégager l'espace autour de l'enfant.
- ▶ Protéger la tête (oreiller).
- ▶ Desserrer les vêtements (ceinture, col) pour lui permettre de bien respirer.
- ▶ Allonger l'enfant sur le côté en position latérale de sécurité, mettre un coussin derrière son dos.
- ▶ Ne pas introduire vos doigts ni d'objet dans la bouche.
- ▶ Ne pas donner à boire ni à manger.



2 OBSERVER LA CRISE

- ▶ Noter l'heure de début de la crise.
- ▶ Observer l'évolution de la crise, sa durée, comment l'enfant récupère.



3 ADMINISTRATION DE VALIUM® INTRA-RECTAL OU DE BUCCOLAM®

Si la crise persiste au bout de 5 minutes,

administration de VALIUM par voie intra-rectale

- ▶ Casser l'ampoule et prélever avec la seringue (sans aiguille) la quantité prescrite (0,5mg/kg soit 0,1ml/kg).
- ▶ Prendre de l'air dans la seringue.
- ▶ Adapter la canule intra-rectale.
- ▶ Orienter la seringue et la canule vers le bas (pour remonter l'air).
- ▶ Introduire la canule dans l'anus de l'enfant et injecter le VALIUM® ; puis serrer les fesses de l'enfant.
- ▶ Possibilité de renouveler l'injection en cas de persistance de la crise 5 minutes après la 1^{ère} injection.



administration de BUCCOLAM par voie buccale

- ▶ Prendre un tube en plastique et briser la bague pour sortir la seringue de Buccolam®
- ▶ Retirer le capuchon rouge.
- ▶ Tirer doucement la joue de l'enfant et introduire l'extrémité de la seringue dans la bouche entre la gencive et la joue.
- ▶ Appuyer lentement sur le piston de la seringue et administrer la totalité de la seringue.
- ▶ Veiller à ce que le produit ne ressorte pas de la bouche.
- ▶ Ne pas administrer de 2^{ème} dose sans avis médical.



Noter l'heure d'administration du médicament



3 EN FIN DE CRISE

- ▶ Laisser l'enfant en position latérale de sécurité.
- ▶ Le rassurer.
- ▶ Ne rien lui donner à boire ni à manger avant qu'il n'est parfaitement récupéré.
- ▶ Prendre sa température : en cas de fièvre, administrer un suppositoire de Doliprane® adapté à son poids.



En cas de persistance de la crise convulsive pendant 10 minutes,

appeler le 15.